

Κορδυλίνα η δενδρώδης (Cordyline fruticosa)



Γένος: Κορδυλίνη
Οικογένεια: Σπαραγγίδες
Τάξη: Σπαραγγώδη
Κατηγορία: Μονοκοτυλήδονα
Φύλο: Αγγειόφυτα

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Τοξικότητα: Γενικά μη τοξικό για ανθρώπους και κατοικίδια, αλλά η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ήπια στομαχική ενόχληση.

Επεκτατικότητα: Δεν θεωρείται επεμβατικό.

Τύπος Φυτού: Αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο.

Διάρκεια Ζωής: Μπορεί να ζήσει αρκετά χρόνια με σωστή φροντίδα.

Χαρακτηριστικά:

Ύψος Φυτού: Μπορεί να ζήσει αρκετά χρόνια με σωστή φροντίδα.

Διάμετρος: Συνήθως απλώνεται 90 έως 150 εκ.

Χρώμα Φύλλων: Ποικιλία αποχρώσεων του πράσινου, κόκκινου, ροζ, κίτρινου ή μωβ.

Περίοδος Ανθοφορίας: Σπάνια ανθοφορία σε εσωτερικούς χώρους. Μικρά, αρωματικά, λευκά ή ροζ άνθη.

Μέγεθος Λουλουδιών: Μικρά, διακριτικά άνθη σε ταξιανθίες πάνω σε μακριούς μίσχους.

Χρώμα Λουλουδιών: Ροζ, μωβ ή λευκό.

Κατανομή:

Προέλευση: Ενδημικό στις τροπικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Παπούα Νέας Γουινέας και της Αυστραλίας.

Φυσικό Περιβάλλον: Ευδοκιμεί σε τροπικά και υποτροπικά κλίματα, συχνά σε δάση ή κατά μήκος ακτογραμμών.

Φροντίδα:

Δυσκολία: Εύκολη έως μέτρια.

Αντοχή: Σχετικά ανθεκτικό και προσαρμόσιμο μόλις εγκατασταθεί.

Συντήρηση: Χαμηλής συντήρησης.

Πότισμα: Διατηρείτε το έδαφος σταθερά υγρό αλλά όχι υπερβολικά βρεγμένο.

Κλάδεμα: Αφαιρέστε ξερά ή κατεστραμμένα φύλλα όποτε χρειάζεται.

Πολλαπλασιασμός: Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα βλαστών ή διαίρεση.

Μεταφύτευση: Μεταφυτεύετε τα νεαρά φυτά κάθε χρόνο· τα παλαιότερα κάθε 2-3 χρόνια.

Συνθήκες Ανάπτυξης:

Θερμοκρασία: Προτιμά θερμοκρασίες μεταξύ 15°C και 29°C.

Ζώνη Ανθεκτικότητας: Καλλιεργείται συνήθως σε USDA ζώνες 10-12.

Απαιτήσεις σε Φως: Ευδοκιμεί σε ημισκιά έως πλήρη ήλιο.

Τύπος Εδάφους: Καλά στραγγιζόμενο, ελαφρώς όξινο έδαφος.

Χρήση: Καλλωπιστικό φυτό για τροπικούς κήπους, φύτευση σε γλάστρες, εσωτερική διακόσμηση και αρχιτεκτονικά στοιχεία τοπίου.

Τοποθεσία: Ευδοκιμεί σε ημισκιά έως πλήρη ήλιο, με καλά στραγγιζόμενο και υγρό έδαφος.

Παράσιτα και Ασθένειες: Γενικά ανθεκτικό σε παράσιτα και ασθένειες, αλλά μπορεί να προσβληθεί από κοκκοειδή έντομα και σήψη ριζών σε κακώς στραγγιζόμενα εδάφη.

